国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	华夏先葆® 西洋参鹿茸玛咖片		
注册人	北京先葆科技有限公司		
注册人地址	北京市通州区新华西街58号院2号楼2524室		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20200244	有效期至	2025年02月04日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年02月07日，批准该产品注册人名称“北京三宝利康医药科技有限公司”变更为“北京先葆科技有限公司”。

国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20200244

华夏先葆® 西洋参鹿茸玛咖片

【原料】玛咖粉、马鹿茸、西洋参提取物、灵芝提取物

【辅料】淀粉、碳酸钙、糊精、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂（羟丙基甲基纤维素、甘油脂肪酸酯）

【标志性成分及含量】每100g含：总皂苷 0.4g、蛋白质 5.0g

【适宜人群】易疲劳者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】本品经动物实验评价，具有缓解体力疲劳的保健功能

【食用量及食用方法】每日2次，每次2片，口服

【规格】0.75g/片

【贮藏方法】密闭，阴凉干燥处存放

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G 20200244

华夏先葆® 西洋参鹿茸玛咖片

【原料】玛咖粉、马鹿茸、西洋参提取物、灵芝提取物

【辅料】淀粉、碳酸钙、糊精、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂（羟丙基甲基纤维素、甘油脂肪酸酯）

【生产工艺】本品经粉碎、过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装、辐照灭菌（ ^{60}Co ，5kGy）等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标
色泽	包衣呈透明无色，片芯呈淡黄色至棕色，色泽均匀
滋味、气味	具本品特有滋味、气味，无异味
状态	包衣片剂，完整光洁，无正常视力可见外来杂质

【鉴别】无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤ 0.3	GB 5009.17
灰分，%	≤ 11.0	GB 5009.4
崩解时限，min	≤ 60	《中华人民共和国药典》
六六六，mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项目	指标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤ 30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤ 0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤ 50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25\text{g}$	GB 4789.10
沙门氏菌	$\leq 0/25\text{g}$	GB 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
总皂苷（以人参皂苷Re计），g/100g	≥0.4	1 总皂苷的测定
蛋白质，g/100g	≥5.0	GB 5009.5

1 总皂苷的测定

1.1 试剂

1.1.1 Amberlite-XAD-2 大孔树脂, Sigma 化学公司、U.S.A.。

1.1.2 正丁醇：分析纯。

1.1.3 乙醇：分析纯。

1.1.4 中性氧化铝：层析用，100-200目。

1.1.5 人参皂苷Re：购自中国食品药品检定研究院。

1.1.6 香草醛溶液：称取5g香草醛，加冰乙酸溶解并定容至100 mL。

1.1.7 高氯酸：分析纯。

1.1.8 冰乙酸：分析纯。

1.1.9 人参皂苷Re标准溶液：精确称取人参皂苷Re标准品0.020g，用甲醇溶解并定容至10.0 mL，即每毫升含人参皂苷Re 2.0 mg。

1.2 仪器

1.2.1 比色计。

1.2.2 层析柱。

1.3 实验步骤

1.3.1 试样处理

1.3.1.1 固体试样：称取1.000 g左右的试样（根据试样含人参量定），置于100 mL容量瓶中，加少量水，超声30 min，再用水定容至100 mL，摇匀，放置，吸取上清液1.0 mL进行柱层析。

1.3.1.2 液体试样：含乙醇的补酒类保健食品，吸取1.0 mL试样放水浴挥干，用水浴溶解残渣，用此液进行柱层析。

非乙醇类的液体试样：吸取1.0 mL试样（假如浓度高、或颜色深，需稀释一定体积后再取1.0 mL）进行柱层析。

1.3.2 柱层析：用10 mL注射器作层析管，内装3 cm Amberlite-XAD-2大孔树脂，上加1 cm中性氧化铝。先用25 mL 70%乙醇洗柱，弃去洗脱液，再用25 mL水洗柱，弃去洗脱液，精确加入10 mL已处理好的试样溶液（见1.3.1），用25 mL水洗柱，弃去洗脱液，用25 mL 70%乙醇洗脱人参皂苷，收集洗脱液于蒸发皿中，置于60℃水浴挥干。以此作显色用。

1.3.3 显色：在上述已挥干的蒸发皿中准确加入0.2 mL 5%香草醛冰乙酸溶液，转动蒸发皿，使残渣都溶解，再加0.8 mL高氯酸，混匀后移入5 mL带塞刻度离心管中，60℃水浴上加热10 min，取出，冰浴冷却后，准确加入冰乙酸5.0 mL，摇匀后，以1 cm比色池于560 nm波长处与标准管一起进行比色测定。

1.3.4 标准管：吸取人参皂苷Re标准溶液（2.0 mg/mL）100 μL放蒸发皿中，放在水浴挥干（低于60℃），或热风吹干（勿使过热），以下操作从“1.3.2柱层析…”起，与试样相同。测定吸光度值。

1.4 计算：

$$X = \frac{A_1 \times C \times V \times 100 \times 1}{A_2 \times m \times 1000 \times 1000}$$

式中：

X—试样中总皂苷含量（以人参皂苷Re计），g/100g；

A₁—被测液的吸光度值；

A₂—标准液的吸光度值；

C—标准管人参皂苷Re的量，μg；

V—试样稀释体积，mL；

m—试样质量，g。

计算结果保留二位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“片剂”的规定。

【原辅料质量要求】

1.玛咖粉：应符合《关于批准玛咖粉作为新资源食品的公告》（2011年第13号）中“玛咖粉”的规定。

2.马鹿茸：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

3.西洋参提取物

项 目	指 标
来源	西洋参
制法	经水提取（8倍量水98-100℃提取3次，每次1.5h）、减压浓缩、喷雾干燥、过筛等主要工艺加工制成。
提取率，%	约20
感官要求	浅棕色粉末，具有特殊滋味、气味，无正常视力可见的外来杂质
总皂苷，%	≥10.0
水分，%	≤5.0
灰分，%	≤10.0
铅（以Pb计），m g/kg	≤2.0
总砷（以As计），m g/kg	≤1.0
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，M PN /g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50

4.灵芝提取物

项 目	指 标
来源	多孔菌科真菌赤芝干燥子实体
制法	经提取（10倍量水98-100℃提取2次，每次2h）、减压浓缩、醇沉（4倍量95%乙醇，静置24h）、水溶解、喷雾干燥、过筛等主要工艺加工制成。
提取得率，%	约5
感官要求	棕黄色粉末，具有本品特有滋味、气味，无正常视力可见的外来杂质
粗多糖，%	≥20.0
水分，%	≤9.0
铅（以Pb计），m g/kg	≤2.0
总砷（以As计），m g/kg	≤1.0
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，M PN /g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50

5.淀粉：应符合《中华人民共和国药典》中“玉米淀粉”的规定。

6.碳酸钙：应符合GB 1886.214《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙（包括轻质和重质碳酸钙）》的规定。

7.糊精：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

8.硬脂酸镁：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

9.薄膜包衣预混剂：应符合《药用薄膜包衣预混辅料（胃溶型）》（浙药准字F20060063号）的规定。

药用薄膜包衣预混辅料（胃溶型）

本品系由符合药用要求的辅料组成的混合物，适用于固体制剂的胃溶型薄膜包衣。

【性状】本品为色泽均匀的颗粒和粉末。

【检查】色差：取供试品和标准样品适量，加入附注的包衣配液用溶剂适量，搅拌45分钟后制成约20%的溶液或混悬液（或调整粘度为0.1Pa·S~0.5Pa·S）；或取上述溶液或混悬液适量，制成厚度均匀的薄膜，烘干，放冷。

（1）仪器法：置色差计上分别进行测定。供试品与标准品的色差值 ΔE 不得过3.0。

（2）目测法：如不能使用仪器法测定时，可采用本法测定。在非直射的自然光或强度为D 65的光源条件下，分别目测上述供试品与标准样品，二者应无明显的颜色差异。

溶化性：取色差项下样品溶液或混悬液约10 mL，均匀徐布在面积为200cm²的镀塑卡纸或载玻片上，于40~50℃烘箱中烘至干燥，取出，放冷，形成厚度约0.1mm的薄膜，取约10cm²的薄膜，置37℃的0.1mol/L盐酸溶液或水中缓缓搅拌30分钟，膜层应溶解或溶散。

干燥失重：取本品，在105℃干燥4小时，依法检查（中国药典2005年版二部附录VIII L），减失重量不得过10.0%。

炽灼残渣：取本品10 g，依法检查（中国药典2005年版二部附录VIII N，温度700℃~800℃），遗留残渣应为理论值的85%~115%或遗留残渣不得过5%（每个产品随附理论值）。

重金属：含有氧化铁的按方法（1）检查，不含氧化铁的按方法（2）检查。

（1）取本品1.0g，缓缓炽灼至完全碳化，放冷，加硫酸0.5~1.0 mL，使恰湿润，用低温加热至硫酸除尽后，加硝酸0.5mL，蒸干，至氧化氮蒸气除尽后，放冷，在500~600℃炽灼使完全灰化，放冷，加7mol/L盐酸溶液10mL溶解，滤过，取滤液，加30%过氧化氢溶液2mL，置水浴上蒸发至约5mL，放冷，移置分液漏斗中，用7mol/L盐酸溶液10mL分次洗涤容器，洗液并入分液漏斗中，用甲基异丁基甲酮溶液（取新蒸馏的甲基异丁基甲酮100mL，加7mL/L盐酸溶液1mL，混匀）振摇提取3次，每次20mL，取水层置水浴上加热20分钟，放冷，滴加氨试液调节

溶液pH 值至3~5，滤过，取滤液加醋酸盐缓冲液（pH 3.5）2m L与水适量使成 25m L，依法检查（中国药典2005年版二部 附录VIII H 第一法），含重金属不得过百万分之二十。

（2）取本品10 g，缓缓炽灼至完全碳化，放冷，加硫酸0.5~1.0 m L,使恰湿润，用低温加热至硫酸除尽后，加硝酸0.5m L，蒸干，至氧化氮蒸气除尽后，放冷，在500~600℃炽灼使完全灰化，放冷，加盐酸2m L，置水浴上蒸干后，加水15m L，滴加氨试液调节溶液pH 值至3~5，滤过，取滤液加醋酸盐缓冲液（pH 3.5）2m L与水适量使成25m L，依法检查（中国药典2005年版二部 附录VIII H 第一法），含重金属不得过百万分之二十。

【作用与用途】 药用辅料。

【贮藏】 密闭，30℃以下保存。