

## 附2

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20190093

### 净心清闲牌灵芪苓胶囊

【原料】 黄芪、茯苓、灵芝、刺五加、珍珠

【辅料】 无

【生产工艺】 本品经提取（茯苓、灵芝、黄芪、刺五加加12倍量水100℃提取2次，每次2h）、过滤、浓缩、粉碎（珍珠）、混合、喷雾干燥（进风口温度170~180℃，出风口温度75~85℃）、制粒、装囊、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 塑料瓶包装应符合GB 4806.7的规定。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	内容物呈棕色
滋味、气味	具本品特有的苦味，无异味
性状	硬胶囊，外观完整光洁、无粘结、变形或破裂；内容物为干燥、疏松、混合均匀的粉末
杂质	无肉眼可见的外来杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
水分, g/100g	≤9.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤12.0	GB 5009.4

崩解时限, min	≤60	《中华人民共和国药典》
铅(以Pb计), mg/kg	≤1.5	GB 5009.12
总砷(以As计), mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞(以Hg计), mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
镉(以Cd计), mg/kg	≤0.5	GB 5009.15
六六六, mg/kg	≤0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤1000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 “MPN计数法”
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10

【标志性成分含量测定】应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
粗多糖(以葡萄糖计), g/100g	≥10.0	1 粗多糖的测定

## 1 粗多糖的测定

1.1 原理: 多糖经乙醇沉淀分离后, 去除其他可溶性糖及杂质的干扰, 糖与硫酸在沸水浴中加热脱水生成羟甲基呋喃甲醛(羟甲基糖醛), 再与蒽酮缩合成蓝绿色化合物, 其呈色强度与溶液中糖的浓度呈正比, 在625nm波长下比色定量。

### 1.2 试剂与仪器

#### 1.2.1 仪器

##### 1.2.1.1 漩涡振荡器

##### 1.2.1.2 离心机(转速4000r/min)

##### 1.2.1.3 分光光度计

##### 1.2.1.4 水浴锅

##### 1.2.1.5 10mL具塞离心管或100mL离心瓶容量。

## 2 试剂

1.2.2.1 实验用水为纯化水；所用试剂为分析纯级。

1.2.2.2 葡萄糖标准液：准确称取1.0000g经过98~100℃干燥至恒重的分析纯葡萄糖，加水溶解后以水稀释至1000mL，此溶液1mL含葡萄糖1mg，用前稀释10倍（0.1mg/mL），现用现配。

1.2.2.3 蒽酮硫酸溶液：精密称取0.05g蒽酮，置于50mL容量瓶中，缓慢加入硫酸溶液（取98%浓硫酸38mL，用水稀释至50mL）至刻度并摇匀，冷却至室温，现用现配。

1.3 样品处理：准确称取样品1.00g，加水约40mL，沸水浴煮沸2h，取出，以3000r/min离心15min，收集上清液，残渣加水约40mL，继续于沸水浴中煮沸2h，离心合并上清液，加水至100mL，取溶液10mL加无水乙醇40mL，摇匀冷藏放置过夜。将沉淀以3000r/min离心15min后取出，将沉淀用水溶解至100mL，备用。

1.4 标准曲线的绘制：准确吸取葡萄糖标准液（0.1mg/mL）0、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL于10mL具塞比色管中，加水至1.0mL，加入蒽酮硫酸溶液5mL充分混匀，在沸水浴中加热10min，取出在流水中冷却20min后，在625nm波长下，以试剂空白调零，测定各管的吸光度值绘制标准曲线。

1.5 样品的测定：准确吸取样品待测液1mL（含糖20~80μg），按1.4项标准曲线绘制步骤于625nm波长下测定吸光度值，并求出样品含糖量。

### 1.6 结果计算

$$X = \frac{C}{m \times 10^6} \times n \times 100\%$$

式中：

X—样品中粗多糖含量（以葡萄糖计），%；

C—由标准曲线查得样品液中粗多糖（以葡萄糖计）的含量，μg/mL；

m—样品质量，g；

n—稀释倍数。

**【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】** 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“胶囊剂”的规定。

### **【原辅料质量要求】**

1. 茯苓：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
  2. 灵芝：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
  3. 黄芪：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
  4. 刺五加：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
  5. 珍珠：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
-