

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20050022

名实牌倍迪胶囊

〈拼音〉

【生产工艺】 生产工艺： 1. 药材公司购入五味子，梔子，枸杞；挑次，水冲洗一次，将生药置于夹层锅提取罐中，加水盖过药面（约为生药量的13倍），浸泡过夜。 2. 次日通蒸汽提取2次，常压煮沸，每次1小时（煮沸后计时），第二次加水量以水盖过药面为准（约为生药量的9倍），提取液经过板框滤泵过滤，去药渣。 3. 滤液减压浓缩（压力：0.07—0.08mpa，温度60—70℃）到一定体积，呈稠状液，移入夹层锅中常压浓至浸膏状（转移的目的是减少浸膏损失），冷却，比重约1.1，备用。 4. 按配方比例加淀粉混合锅中，在搅拌下，缓慢加入浸膏，混匀，制成颗粒，于流通蒸汽烘房中（压力：0.4Mpa，温度约为110℃，5小时），烘干。 5. 粉碎（机器转速4800转/分），过60目筛，烘房瞬间灭菌（105℃，0.5小时），于10万级洁净车间，湿度35—40%，自动填充胶囊，抛光（抛光3000—7000粒/分，YPJ—C型药品抛光机），泡罩压板（DPP—140型铝塑泡罩包装机），检查，包装。 6. 由化验部门抽样检验，凭化验单合格品入库。说明： 1. 药物浸膏与淀粉充分混匀，于流通蒸汽烘房中烘干，已对原材料充分灭菌。 2. 从药品过筛灭菌后开始到泡罩压板，整个过程都在洁净车间内进行。人，物流分开，10万级空气净化。 3. 成品入库前，由化验部门抽验，化验结果合格后方可入库，且检验部门对每个批号的产品均留样观察。 4. 生产和检验部门层层把关，密切配合，确保出厂产品批批合格。

【保健功能】 对化学性肝损伤有辅助保护功能

【适宜人群】 有化学性肝损伤危险者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日3次，每次3粒

【规格】 0.3g/粒

【贮藏】 密封、置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改