

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20050690

华威康利宜康片

HuaWeiKangLiPaiLeYuanPian

【生产工艺】 工艺规程：1、制备提取 I：取人参、山药、黄芪、知母、麦冬、苦瓜放入多功能提取罐内，加入五倍量的水，浸泡3个小时，再加5倍量的水，煎煮2小时，用120目尼龙丝网趁热过滤，得提取液 I 与药渣。 2、制备提取 II：上述药渣加5倍量的水，煎煮1.5小时，用120目尼龙丝网趁热过滤，得提取液 II。 3、制备提取液 III：松花粉经高速气流破壁8.0Mpa，破壁率94-96%，加入8倍量的纯化水，浸泡2小时，120rpm搅拌30分钟，经过滤分离，得上清液，为提取液 III。 4、浓缩：合并提取液 I II III，约60℃减压浓缩至相对密度1.05-1.10（1：1稀释），得浓缩液。 5、喷雾干燥：将上述浓缩液，喷雾干燥得干粉。 6、制粒、混合：将上述干粉分锅制粒，用湿法混合制粒机制粒后，加入浓度5%左右的羧甲基纤维素钠，用量为干燥粉量5-10%，加入颗粒量的0.3-0.5%硬脂酸镁，混均匀。 7、压片：压成0.5g/片。 8、包衣：在薄膜包衣锅进行薄膜包衣，包衣增重2--3%。 9、内包装：塑料瓶包装、铝塑泡罩包装。 10 外包装：塑料瓶装每120片/瓶、150片/瓶、180片/瓶； 铝塑泡罩包装：12片*4板/盒、12片*6板/盒、12片*30板/盒

【保健功能】 辅助降血糖

【适宜人群】 血糖偏高者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日3次，每次4片，饭前服用。

【规格】 0.5g/片

【贮藏】 置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改