

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20060362

唐缘牌微奥胶囊

TangYuanPaiFuZhuJiangXueZhiJiaoNang

【配方】 何首乌、泽泻、绞股蓝、决明子、银杏叶提取物

【生产工艺】 1、将泽泻、何首乌、绞股蓝分别破碎成粗粒，备用。 2、将决明子炒制后，粉碎，过100目筛，备用。 3、将配方量的泽泻粗粒、何首乌粗粒、绞股蓝粗粒混合后，用80%乙醇回流提取三次（第一次用8倍量乙醇回流2h，第二次用6倍量乙醇回流1.5h，第三次用4倍量乙醇回流1h），合并三次提取液，用板框过滤机过滤。 4、滤液减压回收乙醇并浓缩至相对密度1.20～1.25（50℃测定）的稠膏，真空度73.3～86.6Kpa，温度控制在60～70℃。 5、将稠膏进行真空干燥，温度控制在50～60℃，真空度控制在0.08Mpa，将干浸膏粉碎成100目细粉，备用。 6、醇提药渣用水煎煮三次（第一次加6倍量水煎煮1.5h，第二次加5倍量水煎煮1h，第三次加4倍量水煎煮1h），合并三次煎煮液，用板框过滤机过滤。 7、滤液减压浓缩至相对密度1.20～1.25（50℃测定）的稠膏，真空度73.3～86.6Kpa，温度控制在60～70℃。 8、将稠膏进行真空干燥，温度控制在50～60℃，真空度控制在0.08Mpa，将干浸膏粉碎成100目细粉，备用。 9、将醇提浸膏细粉、水提浸膏细粉和决明子、银杏叶提取物置槽型混合机中混合20～30分钟，混合粉经半成品检测合格后用胶囊填充机填充胶囊并分装入瓶。 10、成品为：0.5g/粒，90粒/瓶。 11、1.2.3.4.6.7在一般生产区进行生产，5.8.9在10万级洁净区进行生产。 12、将本品装入0.5立方米箱内，经钴60辐照灭菌，其平均总体吸收剂量为4KGY，辐照消毒，分布不均匀度≤2。 13、食用酒精，优质食用级，含量95%，应符合GB10343-2002 食用酒精标准。

【保健功能】 辅助降血脂

【适宜人群】 血脂偏高者

【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、慢性腹泻者、肝功能不全者、肝病家族史者

【食用方法及食用量】 每日3次，每次2粒，温开水送服

【规格】 0.5g/粒

【贮藏】 密封、置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改